

# Formulario

## Métodos Numéricos

- Bisección:  $c = (b + a)/2$ ,  $E_n = \frac{b-a}{2^n}$ .
- Newton:  $x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$ ,  $E_{n+1} = \frac{f''(\xi)}{2f'(x_n)}E_n^2$ . Secante:  $x_{n+2} = \frac{f(x_{n+1})x_n - f(x_n)x_{n+1}}{f(x_{n+1}) - f(x_n)}$
- Punto fijo:  $x_n = F(x_{n-1})$ ,  $E_{n+1} \leq K^n \frac{|x_1 - x_0|}{1-K}$
- Jacobi:  $Dx_{k+1} = -(L + U)x_k + b$ . Gauss-Seidel:  $(D + L)x_{k+1} = -Ux_k + b$
- Sistemas no lineales (Newton):  $\mathbf{J}(\mathbf{x}_n)(\mathbf{x}_{n+1} - \mathbf{x}_n) = -F(\mathbf{x}_n)$
- Error de interpolación:  $f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}}{(n+1)!}(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)$
- Lagrange:  $L_i(x) = \frac{\prod_{j \neq i}(x - x_j)}{\prod_{j \neq i}(x_i - x_j)}$
- Diferencias divididas:  $f[x_k] = f(x_k)$ ,  $f[x_i, x_{i+1}, \dots, x_j] = \frac{f[x_{i+1}, x_{i+2}, \dots, x_j] - f[x_i, x_{i+1}, \dots, x_{j-1}]}{x_j - x_i}$
- Trapecio:  $\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{2}(f(a) + f(b))$ . Error  $-\frac{(b-a)^3}{12}f''(\xi)$ .
- Simpson:  $\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{3}(f(a) + 4f(x_1) + f(b))$ . Error  $-\frac{(b-a)^5}{720}f^{(4)}(\xi)$ .

## Teoría de Números

- Solución de  $ax \equiv_m b$ :

$$x \equiv_m x_0 + (m/d)k, \quad k = 0, 1, \dots, d-1, \text{ (equiv. } x \equiv_{m/d} x_0),$$

donde  $x_0 = (a/d)^{-1}(b/d)$ .

- Solución de  $x \equiv_{m_1} b_1$ ,  $x \equiv_{m_2} b_2$ :

$$x \equiv_{m_1 m_2 / d} b_1 + \bar{b} \bar{m}_1^{-1} m_1,$$

donde  $\bar{b} = ((b_2 - b_1)/d)$  y  $\bar{m}_1^{-1}$  es el inverso de  $m_1/d$  en  $\mathbb{Z}/m_2\mathbb{Z}$ .